



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS



**CARTÃO DO USUÁRIO**  
PROTOCOLO DE USO DE N.A.P.

Nº CARTÃO SUS: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ FF: \_\_\_\_\_

MEDICAÇÃO DEPOT EM USO: \_\_\_\_\_ DESDE: \_\_\_\_\_

MÉDICO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

APLICAÇÃO DATA	DOSE (MG)	OBSERVAÇÕES	PRÓXIMA APLICAÇÃO DATA
01			
02			
03			
04			
05			
06			

**CARTÃO DO USUÁRIO**  
**TRAGA SEMPRE ESTE CARTÃO QUANDO VIER ÀS CONSULTAS**

ESTE CARTÃO SERVE PARA CONTROLE DA MEDICAÇÃO INJETÁVEL QUE VOCÊ ESTÁ USANDO.

A MEDICAÇÃO É FEITA DE FORMA QUE O REMÉDIO QUE É APLICADO NO MÚSCULO, SEJA LIBERADO PARA O SANGUE BEM DEVAGAR, POR ISSO O EFEITO DURA BASTANTE TEMPO.

ASSIM VOCÊ NÃO PRECISA TOMAR O REMÉDIO TODO DIA, FACILITANDO SEU TRATAMENTO.

“NEUROLÉPTICOS DE AÇÃO PROLONGADA” É COMO OS MÉDICOS CHAMAM ESSAS MEDICAÇÕES.

SEU MÉDICO PODE TER RECEITADO UMA DESSAS MEDICAÇÕES.

HALDOL DECANOATO, FLUFENAN DEPOT, PIPOTIAZINA.

QUALQUER DELES QUE VOCÊ ESTIVER USANDO VAI CAUSAR EFEITOS BENÉFICOS, MAS ÀS VEZES ELES PODEM CAUSAR ALGUNS EFEITOS COLATERAIS (EFEITOS RUINS).

EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA, PROCURE A EQUIPE DE SAÚDE MENTAL QUE CUIDA DO SEU CASO, POIS ELES SABERÃO COMO AJUDÁ-LO.

EXISTEM REMÉDIOS PARA DIMINUIR OU ACABAR COM ESSES PROBLEMAS; ALÉM DO QUE A MEDICAÇÃO PODE SER TROCADA OU SUA DOSE ALTERADA.

COM O USO DESSAS INJEÇÕES PODE SER QUE ACONTEÇA:

- **DISTONIA AGUDA:** TORCICOLO FORTE QUE APARECE DE REPENTE E NÃO MELHORA SOZINHO, MAS QUE DESAPARECE RÁPIDO SE É DADA UMA INJEÇÃO PARA COMBATER O PROBLEMA.

- **IMPREGNAÇÃO :** O CORPO FICA DURO, A PESSOA ANDA COMO UM ROBÔ E COSTUMA BABAR, POIS FICA DIFÍCIL ENGOLIR A SALIVA.

- **INQUIETAÇÃO (ACATISIA) :** AGITAÇÃO, A PESSOA DIZ QUE “AS PERNAS PARECEM QUERER ANDAR SOZINHAS”, NÃO CONSEGUE FICAR PARADA.

- **SONOLÊNCIA EXCESSIVA, DESÂNIMO.**

- **BOCA SECA , INTESTINO PRESO , DIFICULDADE PARA URINAR.**

- **TONTURA :** DEVIDO À QUEDA DE PRESSÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO A PESSOA SE ABAIXA OU SE LEVANTA DE REPENTE. ISTO TENDE A MELHORAR COM O PASSAR DO TEMPO.

- **FEBRE ALTA E CORPO RÍGIDO:** NESSE CASO PROCURE O SERVIÇO DE SAÚDE COM URGÊNCIA, PARA QUE SE DESCUBRA SE HÁ UMA INFECÇÃO OU É UMA REAÇÃO GRAVE AO NEUROLÉPTICO, QUE PRECISA DE CUIDADOS ESPECIAIS.