



## ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE FEZES PARA EXAMES DO GRUPO 8 - COPROLOGIA DO FORMULÁRIO ÚNICO

- ✓ À fresco de fezes (realizar este exame somente para fezes diarréicas)
- ✓ Sangue oculto (não é necessária a dieta prévia)
- ✓ Kato (Encaminhar SADT preenchido junto ao Formulário)
- ✓ PH fecal
- ✓ Rotavírus (no caso de crianças, não coletar a amostra direto da fralda, pois pode mascarar o resultado)
- ✓ Pesquisa de Schistosoma mansoni.
- ✓ Pesquisa de Isospora/Criptosporídeo (SADT e exame realizado apenas para CRT/Aids)

**COLETA DA AMOSTRA:** Coletar 01 porção de fezes frescas (do mesmo dia) equivalente a 01 colher de sopa cheia e encaminhar esta **fezes fresca** e colocar no frasco de rosca transparente sem conservante (formol). Para todas as coletas de fezes é importante evitar o uso de laxantes, supositórios, cremes, pomadas e antibióticos.

**SWAB ANAL:** A coleta deve ser realizada preferencialmente pela manhã antes de levantar da cama, se não for possível, coletar o material na Unidade de Saúde.

O paciente não deverá realizar higiene íntima e/ou evacuar antes da coleta.



## ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE FEZES PARA EXAMES DO GRUPO 8 - COPROLOGIA DO FORMULÁRIO ÚNICO

- ✓ À fresco de fezes (realizar este exame somente para fezes diarréicas)
- ✓ Sangue oculto (não é necessária a dieta prévia)
- ✓ Kato (Encaminhar SADT preenchido junto ao Formulário)
- ✓ PH fecal
- ✓ Rotavírus (no caso de crianças, não coletar a amostra direto da fralda, pois pode mascarar o resultado)
- ✓ Pesquisa de Schistosoma mansoni.
- ✓ Pesquisa de Isospora/Criptosporídeo (SADT e exame realizado apenas para CRT/Aids)

**COLETA DA AMOSTRA:** Coletar 01 porção de fezes frescas (do mesmo dia) equivalente a 01 colher de sopa cheia e encaminhar esta **fezes fresca** e colocar no frasco de rosca transparente sem conservante (formol). Para todas as coletas de fezes é importante evitar o uso de laxantes, supositórios, cremes, pomadas e antibióticos.

**SWAB ANAL:** A coleta deve ser realizada preferencialmente pela manhã antes de levantar da cama, se não for possível, coletar o material na Unidade de Saúde.

O paciente não deverá realizar higiene íntima e/ou evacuar antes da coleta.