



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS



RECOMENDAÇÃO ECOGRAFIA PÉLVICA / ABDOMINAL

PÉLVICA / ORIENTAÇÕES:

- TOMAR 8 COPOS DE ÁGUA 2 HORAS ANTES DO EXAME;
- Manter a bexiga cheia até a realização do exame;

ADULTO / ABDOME TOTAL / ORIENTAÇÕES:

- Jejum de 8 horas;
- Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá com bolacha água e sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos:
- TOMAR 8 COPOS DE ÁGUA 2 HORAS ANTES DO EXAME;
- Manter a bexiga cheia até a realização do exame;
- Se possível, tomar 1 comprimido de Dimeticona (Flagaz ou Luftal), via oral, de 6 / 6 horas, iniciando 2 (dois) dias antes do exame.

ADULTO / ABDOME SUPERIOR / ORIENTAÇÕES:

- Jejum de 8 horas;
- Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá sem açúcar com bolacha água e sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos:
- NÃO É NECESSÁRIO TOMAR ÁGUA NEM MANTER A BEXIGA CHEIA;
- Se possível, tomar 1 comprimido de Dimeticona (Flagaz ou Luftal), via oral, de 6 / 6 horas, iniciando 2 (dois) dias antes do exame.

CRIANÇA / ABDOME TOTAL E ABDOME SUPERIOR / ORIENTAÇÕES:

- Crianças menores de 1 (um) ano = jejum de 3 horas;
- Crianças de 1 (um) a 4 (quatro) anos = jejum de 4 horas;
- Crianças maiores de 5 (cinco) anos = jejum de 8 horas;
- Levar mamadeira ou lanchinho para pós-exame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS



RECOMENDAÇÃO ECOGRAFIA PÉLVICA / ABDOMINAL

PÉLVICA / ORIENTAÇÕES:

- TOMAR 8 COPOS DE ÁGUA 2 HORAS ANTES DO EXAME;
- Manter a bexiga cheia até a realização do exame;

ADULTO / ABDOME TOTAL / ORIENTAÇÕES:

- Jejum de 8 horas;
- Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá com bolacha água e sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos:
- TOMAR 8 COPOS DE ÁGUA 2 HORAS ANTES DO EXAME;
- Manter a bexiga cheia até a realização do exame;
- Se possível, tomar 1 comprimido de Dimeticona (Flagaz ou Luftal), via oral, de 6 / 6 horas, iniciando 2 (dois) dias antes do exame.

ADULTO / ABDOME SUPERIOR / ORIENTAÇÕES:

- Jejum de 8 horas;
- Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá sem açúcar com bolacha água e sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos:
- NÃO É NECESSÁRIO TOMAR ÁGUA NEM MANTER A BEXIGA CHEIA;
- Se possível, tomar 1 comprimido de Dimeticona (Flagaz ou Luftal), via oral, de 6 / 6 horas, iniciando 2 (dois) dias antes do exame.

CRIANÇA / ABDOME TOTAL E ABDOME SUPERIOR / ORIENTAÇÕES:

- Crianças menores de 1 (um) ano = jejum de 3 horas;
- Crianças de 1 (um) a 4 (quatro) anos = jejum de 4 horas;
- Crianças maiores de 5 (cinco) anos = jejum de 8 horas;
- Levar mamadeira ou lanchinho para pós-exame.