

**ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO NO TESTE DE ACUIDADE VISUAL**

NOME DO PACIENTE:

DATA DE NASCIMENTO:

CARTÃO SUS:

PRONTUÁRIO:

Valor do teste de acuidade visual (se o paciente tiver óculos para longe é obrigatório o seu uso no teste)

COM CORREÇÃO:

SEM CORREÇÃO:

O D:

O E:

O D:

O E:

1. Paciente tem história familiar de múltiplos casos de **glaucoma** ou diagnóstico prévio de glaucoma sem acompanhamento?

| se a resposta for sim - risco AMARELO | não

2. Paciente é **diabético**? (paciente não tem DM, vá para questão 3)

| se a resposta for sim - risco AMARELO | não

2.1 Se for diabético, qual o valor da última glicemia? _____ data do exame: _____

Obs.: Se a glicemia estiver superior a 160 mg/ml e a hemoglobina glicada (HbA1C) acima de 6,5%, é necessário controle por pelo menos 4 semanas antes do agendamento para exame de refração e prescrição de óculos.

Se o encaminhamento for para realização do exame do fundo de olho, pode ser encaminhado mesmo sem controle da glicemia.

3. Criança:

| 3.1 Recém nascido com: prematuridade, prematuridade em oxigenoterapia, com pupila branca, estrabismo, fotofobia e olhos grandes com lacrimejamento associado.

| 3.2 Com estrabismo até 7 anos de idade.

| 3.3 Sem estrabismo, porém com acuidade visual medida com óculos menor ou igual a 0,5 em qualquer um dos olhos.

| 3.4 Diferença de duas linhas na acuidade visual entre os olhos.

| 3.5 De 4 a 7 anos de idade com acuidade visual menor ou igual a 0,5 (20/40 na tabela de Snellen) em qualquer um dos olhos.

Se apresentar qualquer uma das situações 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ⇨ risco AMARELO

| 3.6 Criança com acuidade visual corrigida > 0,5 ⇨ risco VERDE

| 3.7 Consulta para troca de óculos se a acuidade visual medida com os óculos for igual ou superior a 0,8 ⇨ risco AZUL

| 4. Pterígio atingindo área pupilar

| 5. Toxoplasmose IgM(+) com comprometimento visual agudo e/ou sinais de inflamação ocular.

| 6. Tumoração na pálpebra ou conjuntiva em indivíduos de pele clara de 50 anos de idade.

| 7. Suspeita de catarata.

Se apresentar qualquer uma das situações 4, 5, 6, 7 ⇨ risco AMARELO

| 8. Cegueira de um dos olhos

| 9. Troca de óculos com acuidade visual < 0,7

| 10. Indivíduos > de 40 anos com dificuldade para ler de perto (presbiopia) ainda sem prescrição de óculos e com comprometimento da atividade profissional.

| 11. Obstrução crônica de vias lacrimais.

| 12. Alterações das margens das pálpebras (entrópio)

Se apresentar qualquer uma das situações 8, 9, 10, 11, 12 ⇨ risco VERDE

| 13. Consulta para troca de óculos em adulto se acuidade visual medida com os óculos for igual ou superior a 0,8

| 14. Indivíduos > de 40 anos com dificuldade para ler de perto (presbiopia) para revisão de prescrição anterior.

Se apresentar qualquer uma das situações 13 e 14 ⇨ risco AZUL

RISCO DO PACIENTE:**AMARELO****VERDE****AZUL**

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

DATA: